

Liljenko Turković, Ampelografija



Merlot noir Merlot black - MERLOT CRNI - Merlot nero Merlot blauer

BEZUVA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ZAGREB - JUGOSLAVIJA

PIA PIVA PRIDRŽAK
TOUŠ BRATČIĆI ZAGREB

IMPRIME PAR
STAMPAŘI DRUŠTVO 'JUGOSLAVIJA' ZAGREB

Merlot crni

SPECIMEN: Kutjevo, 8. X 1952; težina grozda 170 gr.

SINONIMI: franc.; Merlot noir, Merlau, Plant Medoc, Vitraille i dr.; M nero, blauer, black.

PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST: Potječe iz Francuske, gdje se i najviše uzgaja; u manjoj mjeri i u drugim vinogradnim zemljama umjerene klime. Mjestimice uzgaja se i u sjevernim područjima Jugoslavije, s uspjesima koji mogu tek uvjetno zadovoljiti. Prikladan je za područje sjevernog Jadrana.

BOTANIČKA OBILJEŽJA:

Vršci mladica vunasti, zelenkastobijeli; mladi listići na rubovima ružičasti.

Cvijet dvospolan (♀).

Odrasli list okruglast, srednje velik ili veći; 3 do 5-dijelan; postrani gornji sinusi najviše do polovine plojke, na dnu okrugli, kadšto s jednim zubom; postrani donji sinusi manjkaju ili su mali; sinus peteljke malo otvoren; lice zagasito zeleno; naličje rijetko paučino u čupercima; plojka žljebato naborana; srednji dio plojke širok; rebra dosta istaknuta; glavni i sporedni zupci nejednaki, široki, kadšto oštriji; plojka dosta čvrsta; peteljka lista duga kao glavno rebro, jaka, malo crvenkasta; list u jeseni na rubovima porumeni u mrljama.

Zreo grozd srednje veličine, valjkast, kadšto sa sugrozdicom na zglobu; peteljka grozda duga, do zgloba odrvenjela.

Zrele bobice nejednake, okruglaste, modrocrcne, modrosivo opružene; kožica srednje debljine, izdržljiva; meso srednje gustoće; sok malo crvenkast, sladak, ugodna okusa.

Rozga srednje, debljine ili deblja; članci kratki ili srednje dugi; smeđocrvene boje (kao drvo mahagoni), ljubičasto opružena, s crnim točkama.

Rast snažan, poluspravan.

FENOLOŠKI PODACI:

Traži svježa, topla tla, na suhim, ocjedinim položajima. Ne podnosi vlagu zbog truljenja grozda i bujnog razvitka. Prikladan je za umjerenu klimu, ako jesen nije redovno kišovita.

U cvatnji je osjetljiv.

Dozrijeva u II razdoblju.

PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Podnosi različite načine uzgoja, s kraćim ili duljim rezom rodnog drva, prema razmacima sadnje, opremi i staništu.

Radnost srednja.

Otpornost prema smrzavicama srednja, prema peronospori i truleži grozda slaba.

Srodnost s američkim podlogama dobra.

ISKORISTENJE:

Po kvaliteti vino zaostaje za Cabernetima i Burguncem crnim (Pinot), ali je ipak natprosječne vrijednosti. Sadržina alkohola srednja, boje kao rubin crvene. U srednjoj Slavoniji imalo je vino od Merlota u 15-godišnjem prosjeku 17,1% šećera po klost. (od 14,0 do 20,0). Prikladno je za miješanje s vinima drugih crnih sorti. Zbog razmjerno osrednjeg odnosa kvanituma i kvalitete proizvoda, te drugih nedostataka, nije od naročite gospodarske vrijednosti, pa se zato kao ni u Francuskoj ne uzgaja sam, već u sastavu s drugim crnim sortama.

U obzir dolazi za područja, u kojima može nadomjestiti manje vrijedne crne sorte, kao na primjer na području sjevernog Jadrana.

