

Liljenke Turković, Apeloğrafija



Muscat des roses noir *Muscat of roses black* - *MUŠKAT RUŽA CRNI* - *Moscato delle rose nero* *Rosenmuskateller blauer*

IZDATOR:
KRALJEVI SARAJEVO
ZAGREB - JUGOSLAVIJA

BYA PRATA PEKINTANO
KODU DRUŠTU KOSKOVICA

ŠAMPANSKI SARAJEVO, JOZEFINA PRICA, ZAGREB

Muškat ruža crni

SPECIMEN: Kutjevo, 30. IX 1952; težina grozda 180 gr.

SINONIMI: Muškat ruža omiški, Rosenmuskateller blauer, Muscat des roses noir, Moscato (rosa) delle rose nero, Muscadell of roses black.

PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST: Potječe vjerojatno iz Dalmacije (Omiš — Poljica — Krajina), gdje ga sada gotovo i nema. Uzgaja se u manjoj mjeri u Istri i u Slavoniji. Iz Dalmacije prenesen je potkraj prošlog stoljeća (po Baba & Mach) u južni Tirool (S. Michele). Glavni razlog male rasprostranjenosti je ženski cvijet.

BOTANIČKA OBILJEŽJA:

Vršci mladica crvenkasti, neznatno vunasti, završeni.

Cvijet funkcionalno ženski (♀).

Odrasli list velik, okruglast ili s produljenim srednjim dijelom; 5-dijelan, srednje urezan, preklapljenih dijelova plojke; postrani sinusi jajoliko rašireni, na dnu zašiljeni; sinus peteljke manje ili više zatvoren; plojka valovita, glatka; lice tamnozeleno; naličje golo, samo na rebrima sitno čekinjasto; rebro samo prema sastavu s obje strane crvenkasto, inače žutozeleno; glavni zupci istaknuti, dosta široki i oštri; sporedni zupci nejednaki, pilasti; plojka srednje debljine; peteljka lista srednje debela, gola, crvenkasto, nešto kraća od glavnog rebra.

Zreo grozd dosta velik, dug, uzak, granat, rastresit do srednje gust; peteljka grozda debela, duga, kadšto s pojedinim bobama na ogranku zgloba; drvenasta do zgloba, a ostala ogrozdina i stapčice zelene.

Zrele bobice okruglaste ili malo eliptične; srednje veličine i nejednake; crvenomodre ili modrocrcne boje, jako oprasene; kožica jaka; meso sočno; sok neobojen, vrlo sladak, finog nenametljivog muškataog okusa; u povoljnoj se jeseni bobice smežuraju, tvore sušice na čokatu.

Rozga boje lješnika, na malo istaknutim zglobovima nešto tamnija, sitno prugasta; debela; članci dugi.

Rast snažan i bujan.

FENOLOŠKI PODACI:

Najprikladnija su više kamenita, suštila, ne podnosi vlagu; na prozračnim, prisojnim položajima. Prikladniji je za južnjačku, nego za umjerenu klimu.

U cvatnji je osjetljiv zbog ženskog cvijeta.

Dozrijeva u II razdoblju, ali se grožđe ostavlja na čokatu, dok se bobice ne smežuraju, ako je jesen sunčana.

PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Uzgaja se obično nisko, a u umjerenoj klimi i povišeno; reže se na reznike, kondire ili kraće lucnjeve.

Rodnost srednja i neredovita, što uglavnom zavisi o oplodnji.

Otpornost prema smrzavicama slaba; isto tako i prema gljivičnim bolestima, izuzevši prema truljenju grozda (*Botrytis cinerea*).

Srodnost s američkim podlogama dobra. U mršavijim tlima joj odgovara i Rupestris du Lot, a u boljim tlima križanci Berlandieri x Riparia ili Riparia x Rupestris.

ISKORISTENJE:

Daje kao rubin crvena slatka vina fine muškatane arome, koja se ne drži dugo. Naročito je prikladan za proizvodnju prirodnog desertnog vina od smežurenih bobica. U 15 godišnjem prosjeku imao je u srednjoj Slavoniji 22,7% šećera po Klost. (od 19,4 do 24,0 i više), srednje sadržine kiselina.

Kao zobatica prikladan je samo za neposrednu potrošnju.

Po gospodarskoj vrijednosti, to jest po odnosu kvantuma i kvalitete prinosa ne zadovoljava, ali se preporučuje uz druge sorte u većim nasadima za proizvodnju finih muškatah i desertnih vina.

NAPOMENA:

Varijete ti nisu poznati. Često se pogrešno naziva M. »ružičasti«, umjesto ispravno M. »ružica«, po finom mirisu ruža.

