

Filenke Turković, Topelografija



Fritz Turković

Dinka rouge Dinka red - RUŽICA CRVENA - Dinka rossa Steinschiller roter

EDITEUR
KARLOVIČ BRNOŠ
ZAGREB - BOGOLAVIĆA

UVA PRVA PROJEKTA
TOUS DROITS RÉSERVÉS

IMPRIMERIE PER
STAMPAŘKI ZAVOD, OJNER PRICA ZAGREB

Ružica crvena

SPECIMEN: Kutjevo, 1. X 1952; težina grozda 220 gr.

SINONIMI: Dinka mala, Kövidinka, Steinschiller, Rosentraube, Werschelzer, Fleischtraube, Raisin de rose, Dinka rouge, rosso, red.

PORIJEKLO I RASPROSTRANJENOST: Potječe iz područja srednjeg toka Dunava i Tise, a najviše se uzgaja u južnoj Mađarskoj i u Jugoslaviji (Vojvodina, Srijem, Slavonija).

BOTANIČKA OBILJEŽJA:

Vršci mladica kratki, uspravni, bjelkasto vunasti; mladi listići na rubovima malo crvenkasti.

Cvijet dvospalan (3).

Odrasli list: srednje velik, akrglast, cio ili malo i nejednolično urezan; sinus peteljke otvoren, oblika slova »U«; lice golo, naličje slabo pusteno; plojka naborana, svijetlozelena, zagasita, srednje debijine; rebra prema sastavu sa obje strane crvenkasta, inače žućkasto-zelena, dosta tanka; glavni i sporedni zupci široki, tupi, nejednaki; peteljka lista dosta debela, nešto kraća od glavnog rebra, s obje strane crvenkasta, s bjelkastim vunastim dlačicama; list u jesen požuti, a kod čokota slabijeg habitusa ranije otpada.

Zreo grozd srednje veličine, gust, čunjast, često sa sugrozdicem; peteljka grozda kratka, jaka, crvenkasta i rano odvrveni; stapčice boba kratke, jake.

Zrele bobe srednje veličine, nejednake, okrugle, živocrvene boje, modrikasto oprasene; kožica dosta jaka i otporna; meso sočno; sok neobojen, bez naročita okusa; bobe se dobro drže čaške.

Rozga karakteristično kratkih članaka (uspravan rast); srednje debijine; boje lješnika, modrikasto oprasene; zglobovi malo istaknuti; pupovi veliki, široki.

Rast uspravan, grmlik, srednje snažan.

FENOLOŠKI PODACI:

Najprikladnija su laka, pjeskovita, praporna tla, na prisojnim, ocjedinim položajima. Prikladna za poluaridnu kontinentalnu klimu sa sušnom jeseni zbog kasnog dozrijevanja, ali podnosi dobro i kraće kišne periode za vrijeme dozrijevanja.

Dozrijeva potkraj III razdoblja. Zato nije prikladna za uzgoj u sjeverozapadnim krajevima, to jest zapadnije od srednjo-slavonskog gorja, gdje dozrijevanje grozda općenito kasni za 8 do 10 dana.

PRAKTIČNA ISKUSTVA:

Uzgoja se obično nisko, »na rogove«, ali podnosi i srednje visoke načine uzgoja, prema podlozi i staništu; reže se na reznike, ali pokazuje dobre rezultate i na dvokraku s duljim rodnim drvom.

Rodnost velika i redovita.

Otpornost prema smrzavicama srednja; prema gljivičnim bolestima dobra, a naročito prema truljenju grožđa (*Botrytis cinerea*).

Srodnost s američkim podlogama dobra, a naročito jaj u mršavi-jim tlima odgovara *Rupestris du Lot*. Na Ripariji i na križancima *Berlandieri x Riparia* traži plodnija i bolje negovana tla.

ISKORISTENJE:

Daje lako, ljupko stolno vino od 9,5 do 10,5 vol. % alk., s malo kiseline, prema uslovima staništa i količini prinosa. U dobrim godinama odlikuje se ugodnom, specifičnom aromom, zbog čega se dobro prodaje. Vino se dobro čuva i izgrađuje. Rahliji grozdovi krupnijih boba prikladni su i za jelo, a vrlo se dobro spremaju do kasnog proljeća, iako ne podnose transport na veće udaljenosti. Dobre je gospodarske vrijednosti, naročito po odnosu kvantuma i kvalitete prinosa, kao i po drugim prednostima. Prikladna je kao dopuna u čistim nasadima, zbog kvantuma prinosa, uz Graševinu i druge kvalitetne sorte.

NAPOMENA:

Od varijeteta spominje se Ružica bijela (Fehérdinka, weisser Steinschiller), koja je malovrijedna sorta. - Dinka crvena (Bagri-na, Dinka vörös, Gewürztraube), druga je sorta ženskog cvijeta (vidi Ampelografski atlas I dio), kao i *Bogdany dinka* ili *Turska ružica* (Török-dinka), iako »Dinke« u glavnom pripadaju jednoj skupine sorti, više ili manje različitih obilježja i vrijednosti.

